

AVERTISSEMENTS **GRICOLES** téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

BIBLN
00605 03003 00097 3127A 07/05/93-13h U
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
REGIE DEPOT LEGAL
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE
58, RUE RICHELIEU

75000 PARIS

Bulletin n° 239 (12/93) du 7 Mai 1993

POIS : Surveillez les pucerons
BLE : Attention à la septoriose
ORGE : Deuxième intervention fongicide

COLZA

Stade : G3 à G4.

CHARANCON DES SILIQUES

Situation

Quelques pontes sont déjà déposées.

Préconisation

Le traitement reste encore possible sur les parcelles qui atteignent le seuil de 1 charançon pour 5 plantes.

PUCERONS CENDRES DU CHOU

Situation

Très présents sur l'ensemble de la région.

Préconisation

Un traitement de bordure peu suffire. Intervenez sur l'ensemble de la parcelle si vous avez en moyenne 2 colonies au mètre carré.

MALADIES

Fin des interventions sclérotinia et pseudo-cercospora. Seule l'alternaria reste à surveiller jusqu'à 3 semaines avant récolte ; maladies absentes actuellement.

POIS

Stade : 10 feuilles à tout début floraison.

PUCERONS

Situation

21 captures à la tour à succion de Poitiers en Avril. Début de colonisation sur l'ensemble de la région.

Préconisation

Surveillez l'évolution et intervenir dès que le seuil de 30 pucerons par plante est atteint (seuil non atteint actuellement).

MALADIES

Situation

Quelques rares taches d'anthracnose sur certaines parcelles.

Préconisation

Il est trop tôt pour intervenir.

BLE

Stade : 8 à 10.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

ROUILLE BRUNE

Situation

Explosion confirmée sur la façade atlantique. Dans les autres secteurs, des pustules, généralement peu nombreuses, sont présentes sur variétés sensibles au niveau des étages foliaires intermédiaires. Elles évoluent vers les étages supérieurs.

SEPTORIOSE

Situation

La sortie de taches consécutives aux pluies de fin Mars à mi-Avril se produit actuellement. Une nouvelle vague de symptômes devrait apparaître au milieu de ce mois.

Préconisation

- Potentiel inférieur à 60 qx/ha (parcelles non traitée) :

Intervention souhaitable dès que possible. Utiliser une triazole performante sur rouille et/ou septoriose selon la sensibilité variétale.

- Potentiel supérieur à 60 qx/ha :
. 1er traitement réalisé début Avril : programmer une seconde intervention dès l'apparition des épis.

. 1er traitement réalisé à partir du 15 Avril : pas d'intervention pour le moment. Attendre l'épiaison.

. Pas d'intervention jusqu'ici. intervenir très rapidement avec un fongicide polyvalent.

ORGE

Stade : 8 à 10.1

HELMINTHOSPORIOSE

Situation

Les symptômes continuent à évoluer vers les feuilles supérieures dans les parcelles témoins non traitées.

Préconisation

Programmer dès maintenant une seconde intervention nécessaire pour stopper la progression de cette maladie. Un effet complémentaire de la triazole sur rouille naine est souhaitable.

MAIS

SESAMIE

Situation

L'élevage de nymphes ainsi que la modélisation nous indiquent dès maintenant un début de vol probable vers le 10-15 Mai en Sud Charentes.

Des informations plus complètes seront fournies dans le prochain bulletin.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES
VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre
autorisation



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIAARD
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693